and with broad whitish outer margins on four or five of the tertiaries; on those nearest to the back the marginal colour is yellowish. Long. tot. 3″ 3‴; rostr. a fr. 10½‴; al. 4″ 9‴; caud. 3″; tars. 9‴.

From the *O. brachyrhynchus* of Swainson this Angolan bird is easily distinguished by the different colouring of the tail, the two medial rectrices being olive-green with black tips.

(7.) Hyphantornis xanthops, n. sp.

Supra flavescenti-viridis, alarum plumis dorsi colore marginatis; uropygio flavescentiore; cauda viridi; capite corporeque inferiore toto læte vitellinis; gutture rufescente lavato; subalaribus et flexura alæ flavissimis; pedibus carneis; rostro nigerrimo. Long. vix 7″; rostr. a fr. 9‴; al. 3″ 5‴; caud. 2″ 8‴; tars. 11‴.

Allied to *H. aurifrons* and *H. capensis*, but different from both.


XXXVI.—*Description d'une nouvelle espèce de Pigeon du genre* Leucotreron. Par MM. Jules Verreaux et O. DesMurs.

(Plate XII.)

Leucotreron gironieri, J. Verr. et O. DesMurs.

L. supra læte viridis, subtus viridi-cinereus; macula gulari stricta, pectorali latiore, purpureis; abdomine medio, ventreque infero rufo-albidis; tectricibus subcaudalibus pallide cinnamomeis; pedibus rubris.

Couleur générale d'un vert-clair, tirant au cendré sur les parties inférieures; front et face d'un cendré légèrement teint de vert; une tache longitudinale au menton, une beaucoup plus large et transversale sur le bas de la poitrine, d'un pourpre foncé; milieu du ventre et du bas-ventre d'un blanc-roussâtre; couvertures inférieures de la queue d'un roux-canelle pâle; ailes du même vert que la partie supérieure, à rémiges primaires noires sur leur page interne, et bordées, ainsi que les secondaires, de jaune pâle tirant sur le blanc, dans les premières surtout; couvertures alaires inférieures du même vert que le dessous du corps; queue du même vert-clair que les ailes, terminée, à son extrémité, de vert-olive bordé de blanchâtre. Bec jaune-rougeâtre à la base de la mandibule inférieure; tarses vêtus



Hennens del et lith

LEUCOTRERON GIRONIERI

jusqu'à moitié de leur longueur, et du même vert-cendré que le reste; la partie nue et les doigts d'un rouge-carmin; ongles bruns.

Longueur totale	28	centimètres.
„ de l'aile fermée ...	14 „	05 mill.
„ de la queue	10 „	

Cette espèce, qui a été envoyée de Tallawan (Philippines) en 1861, par notre ami De la Gironière, a beaucoup d'analogie avec le *L. gularis*; mais elle s'en distingue facilement, tant par sa taille bien moindre que par la teinte verte des parties inférieures; par la tache pourpre qui se trouve sur la poitrine; par la queue, qui est proportionnellement plus courte et plus arrondie; par le blanc-roussâtre du ventre; et enfin par la couleur canelle pâle qui couvre les couvertures souscaudales. Le dessus de la tête et du cou sont aussi d'un vert qui n'existe pas dans le *L. gularis.* La première rémige est rétrécie de même. Nous la dédions à M. De la Gironière comme un hommage de l'intérêt qu'il porte à la science.

[In reference to this bird, Mr. George Gray, in reply to some inquiries, kindly sends us the following remarks :—"The *Leucotreron gironieri* is closely allied to the *Trerolæma lechlancheri* of New Guinea (Bp. in Compt. Rend. xli. p. 247); but the latter is white on the front, throat, and breast, and the abdomen is green, with a very large patch of obscure purple on the breast below the white." Along with *L. gularis* these two birds form the section *Trerolæma* of the genus *Leucotreron.*—Ed.]

XXXVII.—*Sur l'*Anthus *des Canaries reconnu comme espèce nouvelle et nommé* Anthus berthelotii. Par Charles Bolle (de Berlin).

(Plate XII.)

Synonymie : *Anthus trivialis,* Webb, Berthelot, et Moquin-Tandon, Ornithologie Canarienne; non Linn. (sub *Alauda*); C. Bolle, Bemerkungen über die Vögel der Canarischen Inseln, in Cabanis' Journ. ii. (1854) p. 455.—*A. campestris,* C. Bolle, Zweiter Beitrag zur Vögelkunde der Canarischen Inseln, *l. c.* v. p. 288; non Bechst.—? *A. pratensis,* E. Vernon Harcourt,